

MAXI-GROW EXCEL[®]

Regulador de crecimiento, solución acuosa

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

	%P/V
Nitrógeno (N) _____	0.66
Fósforo (P ₂ O ₅) _____	1.33
Potasio (K ₂ O) _____	1.33
Calcio (CaO) _____	0.28
Magnesio (MgO) _____	0.66
Hierro (Fe) _____	1.72
Cobre (Cu) _____	1.33
Zinc (Zn) _____	2.65
Manganeso (Mn) _____	1.33
Materia orgánica _____	11.25

ASPECTO FÍSICO: Suspensión acuosa

PRESENTACIÓN: Envase de 250 mL y 1 L.

INFORMACIÓN GENERAL:

MAXI GROW EXCEL es un bioestimulante complejo de origen orgánico que contiene micronutrientes en forma quelatada. Todos estos componentes interactúan sobre los procesos metabólicos de las plantas, pudiendo favorecer incrementos en las cosechas.

Algunas de las funciones son:

- Promover el crecimiento vigoroso de raíces
- Impartir resistencia a las plantas para enfrentar condiciones adversas
- Estimular la producción de flores y amarre de frutos
- Acelerar la maduración
- Hacer más eficiente la absorción de nutrientes por la raíz
- Aumentar la calidad y el tiempo de vida de los frutos después de la cosecha.

En general es muy conveniente aplicar la combinación de **MAXI GROW EXCEL** con FOSFACEL 800 poco antes de la etapa de floración.

RECOMENDACIONES:

CULTIVO	DOSIS* Kgs/ha	EPOCA Y NUMERO DE APLICACIONES
Alfalfa	500 cc	Después de cada corte, cuando la planta tenga entre 10 y 15 cm de altura
Algodón	300 cc	Cuatro aplicaciones con intervalo semanal, a partir del inicio de formación de cuadros.
Cafeto	600 cc	1. En pos cosecha, una vez que ha iniciado el brote vegetativo 2. Hinchamiento de la yema floral 3. Cuando el fruto tenga entre 2 y 3 mm de diámetro
Chile, tomate, berenjena	500 cc	1. Inicio de floración 2. Amarre de fruto 3. Dos semanas después
Papa	300 cc	1. Entre la 6ª y 8ª hoja 2. un mes después
Frijol, soya, garbanzo, chícharo	600 cc	1. Perfloración
Fresa	500 cc	1. Inicio de floración 2. Llenado de fruto 3. Cambio de color de fruto
Frutales	700 cc	1. Inicio de floración 2. Amarre de fruto 3. Dos a tres semanas después
Maíz y sorgo	600 cc	1. Entre la 6ª y 8ª hoja.
Melón, pepino, sandía, calabaza	500 cc	1. Inicio de floración 2. Amarre de fruto 3. A cambio de color del fruto
Aguacate y Mango	750 cc	1. Inicio de floración 2. Amarre de fruto 3. Dos a cuatro semanas después
Trigo, avena, cebada, arroz	600 cc	1. Entre la 2ª y 5ª hoja
Vid para mesa	600 cc	1. De 8 a 10 días después de brotación. 2. Inicio de floración 3. Cuando el fruto tenga entre 2 y 3 mm de diámetro.
Vid industrial	600 cc	1. Cuando los brotes tengan entre 15 y 30 cm de longitud 2. Inicio de floración 3. Maduración de fruto o cambio de color

(*) En aspersiones terrestres se recomienda utilizar de 200 a 400 litros de agua/Ha. En aspersiones aéreas, de 50 a 100 lts de agua/Ha.

INDICACIONES DE USO:

MAXI GROW EXCEL es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso común, excepto con aquellos de pH alcalino. Es recomendable hacer una prueba de compatibilidad, cuando existan dudas al mezclarlo con algún agroquímico.

PRECAUCION:

ADVERTENCIAS DE USO: Utilice el equipo de seguridad adecuado (overol, lentes, mascarillas). Evítese el contacto directo con la piel y los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, aplicar tratamiento sintomático.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: Disponga de los envases vacíos de acuerdo a l reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente en materia de residuos peligrosos.

No contamine cuerpos de agua, especialmente donde haya peces, o que se utilicen para consumo humano o como abrevaderos para ganado.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No se almacene ni transporte junto a alimentos, ropa, forrajes. Almacénese en un lugar fresco y seco. No se deje a la intemperie